

**Encuesta que explora el conocimiento y la opinión que tienen sobre cigarrillos electrónicos un grupo de estudiantes de una universidad pública colombiana [5/35]**



GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
"SALUD DE LA MUJER"




Álvaro Monterrosa-Castro, María Payares-Herrera. Facultad de Medicina. Universidad de Cartagena.

**La encuesta hace parte del brazo "Cigarrillos Electrónicos" del Proyecto de Investigación DISEU**

**[Dinámicas Psicosociales en Estudiantes Universitarios].**

- ❖ Se encuestaron 791 estudiantes universitarios, a quienes se les solicitó opinar como falso, cierto o no sabe, sobre treinta situaciones en relación con los cigarrillos electrónicos.
- ❖ El 51,8% son estudiantes de medicina.
- ❖ El 48,2% son estudiantes de ciencias humanas.
- ❖ La edad promedio es 20,01 ± 3,29 años.
- ❖ El 66,7% están en los primeros cinco semestre de estudio.
- ❖ El 42,1% son hombre y el 57,9% son mujeres.
- ❖ El 52,8% son adolescentes y el 47,2% son adultos.
- ❖ El 3,5% fuma cigarrillos tradicionales.
- ❖ El 73,4% nunca ha usado cigarrillos electrónicos, el 20,3% antes los utilizaban y el 6,2% lo usan.

**Los cigarrillos electrónicos no se relacionan con afectación pulmonar**



**Respuesta correcta: falso. Varios estudios han demostrado asociación significativa entre el uso de cigarrillo electrónico con irritación de las vías respiratorias, mayor frecuencia de asma, exacerbación en los episodios de espasmo bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.**

**Se ha descrito la lesión pulmonar asociada al vapeo (EVALI). Rose et al. Circulation. 2023;148(8):703-728.**