



# CORRELACIÓN ENTRE ANSIEDAD PREOPERATORIA Y NECESIDAD DE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO,



## EN MUJERES INFERTILES SOMETIDAS A LAPAROSCOPIA

*Quintana-Guardo Freddy, Monterrosa-Castro Álvaro.*

Grupo de Investigación Salud de la mujer. Facultad de Medicina. Universidad de Cartagena

**INTRODUCCIÓN:** La Ansiedad Preoperatoria (AP) es una situación que se debe tener en cuenta, puesto que incide en la atención intrahospitalaria como en la recuperación posquirúrgica

**OBJETIVO:** Estimar la frecuencia de AP y su correlación con la necesidad de más información sobre el procedimiento y la anestesia

**METODOLOGIA:** Estudio transversal en 198 mujeres con infertilidad en estudio, valoradas antes de ser sometidas a laparoscopia diagnóstica en la Clínica Santa Cruz de Bocagrande, Cartagena, Colombia. Participación anónima y voluntaria con consentimiento informado. Se aplicó un formulario que incluía características sociodemográficas y la versión en español de la escala Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS). Análisis realizado con EPI-INFO-7. Se utilizó coeficiente de correlación Spearman ( $\rho$ )


### Características Sociodemográficas

Edad	33.6 ± 4.9
	N(%) [IC95%]
Embarazo Previo	46 (23.2) [17.5 - 29.7]
Aborto Previo	52 (26.1) [20.2 - 32.9]
Laparoscopia previa	60 (30.3) [23.9 - 37.2]
Cirugía Previa	109 (55.0) [47.8 - 62.1]

### Coeficiente de Correlación de la AP

Variable	$\rho$	CI95%	P
Edad	0.00693	-0.133 to 0.146	0.9228
N° embarazos previos	0.00846	-0.131 to 0.148	0.9058
N° abortos previos	0.00689	-0.133 to 0.146	0.9232
N° laparoscopias previas	0.0185	-0.121 to 0.158	0.7955
N° cirugías previas	-0.0637	-0.201 to 0.0764	0.3725
Necesidad de más información	0.431	0.310 to 0.538	<0.0001

### Prevalencia Ansiedad Preoperatoria



SÍ: 25 (12.6%)  
[IC95%:8.3 - 18.0 ]  
NO: 173 (87.3%)  
[IC95%:81.9 - 91.6 ]

### Necesidad De Más Información

	n (%) [IC95%]
Alta	57 (28.79) [22.59 - 35.63 ]
Media	54 (27.27) [21.20 - 34.04]
Baja	87 (43.94) [36.91 - 51.15 ]

### CONCLUSIÓN:

Se encontró AP en el 12.6% del grupo estudiado. La AP se correlacionó positiva y significativamente con la necesidad de más información sobre el procedimiento/anestesia

